

تأثير عامل الزمن و
بالنحاس والحديد في العلاقة بين اعداد العقد البكتيرية
الجزرية واوراق نباتات الفاصولياء

Effect of time factor, spray feeding of Copper and Iron in the relation
between the number of bacterial root nodules and leaves of Bean

علي صبيح عبد الأمير

كلية العلوم للنبات

Ali Sabeeh Abdulameer

College of Science for Women/ Baghdad University

نفذت تجربة سنادين خلال الموسم الربيعي 2008 بهدف دراسة تأثير عامل الزمن والاصحاب الورقي بالنحاس والحديد في العلاقة بين اعداد العقد الجزرية البكتيرية واوراق نباتات الفاصولياء حيث اظهرت نتائج التحليل الاحصائي تفوق معاملات الرش بالنحاس والرش بالحديد معنوياً على معاملة مقارنتهما (الرش بالماء فقط) ق زمن الرش بالحديد بعد 20 يوم من البذار معنوياً على معاملة زمن الرش بالحديد بعد 30 يوم من البذار وتفوق صنف البذور الاسباني على صنف البذور البرازيلي في كل من اعداد العقد الجزرية واوراق نباتات الفاصولياء واطهر كل من اعداد العقد الجزرية واعداد اوراق النباتات علاقة ارتباط موجبة معنوية ($r=0.899$) فقد اظهرت معاملة التداخل $Fe1 \times Cu1 \times S2$ أعلى قيم لاعداد العقد الجزرية واوراق نباتات الفاصولياء ليغت 9.00 / 59.33 /

Abstract

Not experiment was carried out during the spring season in the year 2008 to investigate the effect of the time factor, spray feeding of copper and Iron on the relation between the number of nodules and leaves of Beans. The statistical analysis showed that spray feeding of copper and Iron exceed significantly on the control treatment (water spray feeding), also, the spray feeding of Iron after 20 days of seeding excelled significantly on the spray feeding of Iron after 30 days of seeding, as well as the Spanish type of seed surpassed significantly on the Brazilian kind of seed in the number of root nodules and leaves of bean. On the other hand the studied characteristics appeared positive significant correlation coefficient ($r=0.899$). The interaction (overlap) treatment $Cu1 \times S2 \times Fe1$ recorded the highest values in both root nodules and leaves of bean by 9.00 nodule/ plant and 59.33 leaves/ plant, respectively.

ان الزمن عامل مهم جداً بالرغم من انه اقل العوامل المدروسة . كما ان تثبيت النتروجين حيويًا يمكن ان يكون بديلاً عملياً عن اسمدة النتروجين الغالية والملوثة للبيئة [1] إن سمد النتروجين الكيميائي هو الأكثر كلفة واستهلاكاً للطاقة وتلويثاً للبيئة [2] ، كما إنه يتعرض إلى عمليات فقد تصل إلى نسبة 50% والتحول إلى صورة غير جاهزة في التربة ، لذا لجاء إلى استعمال أنظمة حيوية صديقة للبيئة مسؤولة عن عملية تثبيت النتروجين الجوي حيويًا لتجهيز النتروجين [3] ، وان التقنيات الجزيئية الحديثة أظهرت إن تثبيت النتروجين حيويًا يلعب دور المحافظ على الحياة في الأرض وان الأنظمة البيئية الأكثر كفاءة هي البكتريا من جنس الرايزوبيوم [4] . [5] إن تكامل النظرات الجزيئية بدراسات أساسها المختبر والحقل والفلسفة والكيمياء الحيوية مطلوبة لتحسين فهم الأهمية البيئية والاقتصادية لاستجابة الرايزوبيا للعناصر المغذية. ان النحاس من المغذيات الضرورية مع متطلب مباشر في ايض الرايزوبيا لتتمكن من البقاء والنمو كاحياء حرة المعيشة وكاحياء متكافلة مع البقول وان الاشكال المفيدة للنحاس لبكتريا الرايزوبيا في محلول التربة هي Cu^{+2} ومركبات النحاس العضوية وان له فائدة مباشرة في الاداء الوظيفي الانزيمي في الرايزوبيا كما وان له دور ايش مع النباتات البقولية من خلال تكوين العقد الجزرية وتثبيت النتروجين الجوي .

الحال بالنسبة للحديد وصور الحديد المفيدة لبكتريا الرايزوبيا في محلول التربة هي Fe^{+2} و Fe^{+3} والحديد المخليبي وان له دور مهم اضافي كمؤشر كيميائي تنظيمي في الخلية [5].

يعد الحديد العنصر الرابع من حيث انتشاره في القشرة الارضية الا ان نقص الحديد في التربة على العموم ومنها التربة العراقية هي الظاهرة الاكثر صعوبة من حيث المعالجة بسبب الفة الحديد لتكوين مركبات ثابتة مع السليكون والاكسجين والكبريت ولقابليته العالية على الاحلال محل الالمنيوم والمغنيسيوم. فالتربة القاعدية الحاوية على نسبة عالية من كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم كما في التربة العراقية تعاني بدرجة كبيرة من نقص الحديد. حيث يترسب الحديد في التربة بهيئة هايدروكسيدات الحديد غير جاهزة للامتصاص [6,7].

ان تجهيز المغذيات عن طريق الجذور قد يُحد في بعض الظروف البيئية والتربة مثل الـ pH ان مثل هذه الظروف تسود في المناطق القاحلة ونصف القاحلة [8].

ان التربة العراقية تقع ضمن تربة مناخ البحر الابيض المتوسط وتتصف بانها ذات محتوى عالي من كاربونات الكالسيوم ودرجة تفاعل قاعدية وانخفاض نسبة المادة العضوية لذا فان الحديد المترسب هو السائد [6,7]. ففي هذا النوع من التربة تكون اضطرابات المواد المغذية هو العامل المُحدِّد الأكثر أهمية في انتاج المحاصيل حيث ان عدم توفر المغذيات الصغرى ممكن ان تُعيقُ إنتاج المحاصيل [9]. وهنا يبرز دور الاخصاب الورقي الضروري لتعويض نقص المواد المغذية عن طريق الجذور أو لتصحیح نقص هذه المواد المغذية أو لمواجهة الحاجات العظيمة لهذه العناصر عن طريق الأوراق [10].

وعلى ما يبدو ان الدراسات حول تأثير الزمن والخصاب الورقي بالنحاس والحديد في اعداد العقد الجذرية البكتيرية واوراق نباتات نوعين من الفاصولياء ضئيلة جداً او غير موجود اصلا في العراق الحالي لتقييم تأثير مستويان من النحاس وثلاثة مستويات من الحديد ونوعين من بذور نباتات الفاصولياء مع تلقيح البذور باللقاح الرايزوبي في العلاقة بين اعداد العقد الجذرية والاوراق ليتبعها دراسة هذا التأثير على باقي

اجريت تجربة سنادين ذات حجم 15 في كلية الزراعة / جامعة بغداد في الموسم الربيعي 2008 حيث ملئت بتربة معقمة بطريقة بروميد المثليل باستعمال التصميم RCBD الصفات الكيميائية والفيزيائية للتربة المستعملة باستعمال الاجراءات التحليلية القياسية وكما مبين في جدول (1)

(1) : بعض الصفات الكيميائية والفيزيائية لتربة الدراسة

القيم	
16	
46	% الغرين
38	الطين
	مزيجة طينية غرينية
2.43	Ec (ds/m)
7.91	pH
10.12	O. M. (g/kg)
248.24	CaCO ₃ (g/kg)
0.70	Total N (g/kg)
0.161	P (Cmolc/kg)
5.96	Fe (mg/Kg Soil) الجاهز
0.51	Cu (mg/kg Soil) الجاهز

تم اعتماد اثنا عشر معاملة في التجربة ناتجة عن مستويان من النحاس (Cu1, Cu0) ، 25 /Cu بهيئة $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (25% نحاس) وبمعدل رشتين بعد 25 40 يوم من البذار مستويات من الحديد (Fe2, Fe1, Fe0) وبفترتين زمنيتين مختلفتين (صفر رش ماء فقط 60 / 20 يوم من البذار ونفس التركيز بعد 30 يوم من البذار) باستعمال الحديد المخليبي EDTA (13% حديد) ونوعين من بذور نباتات الفاصولياء (S2, S1) (برازيلي (احمر) و اسباني (ابيض) ت الحصول عليها من شركة الدهلكي للمنتوجات الزراعية مع تلقيح البذور بخليط اللقاح المكروبي تابع للبكتريا *Rhizobium legum* خليط السلالتين (889 1865) تم الحصول عليها من مركز اباء

للبحاث الزراعية حيث سمدت كل السنادين بـ 125 K/ه بهيئة كبريتات البوتاسيوم (41.5%K) 40
 ه/ن بشكل نترات الامونيوم (33%N) 60 P/ه بهيئة السوبر فوسفات
 (20%P) بواقع جرعتين الاولى قبل البذار والثانية عند الازهار .
 ومورست كل الاجراءات الزراعية / 30
 كازالة الاعشاب والري لحدود السعة الحقلية بصورة منتظمة [11] 50 يوم تم تسجيل القياسات
 . حيث تم اعتماد اجراءات قياسية حديثة لتسجيل وتحليل 75 يوم القيا
 Microsoft Excel 2007 SAS 2005
 LSD عند مستوى معنوية 5 %.

1 تأثير النحاس في اعداد العقد الجذرية

اظهرت نتائج التحليل الاحصائي وجدول (2) CuI معنوياً مقارنة بباقي معاملات النحاس
 باحرازها اعلى متوسط اعداد عقد جذرية بلغ 5.89 / 4.50 . اظهرت عدد من الدراسات ان نقص النحاس المبكر في التربة يتعارض مع
 عملية تثبيت النتروجين بواسطة العقد الجذرية الرايزوبية لنباتات الجت الابيض والجت تحت الارضي
 (Subterranean Clover) . الا ان الدور الحيوي الكيميائي (Biochemical) للنحاس ليس واضحاً لحد الان
 ويحتاج المزيد من الدراسة [5, 12] لكن التغذية الارضية بالنحاس لنباتات الترمس *Lupinus luteus* L له
 تأثير ايجابي على عملية تثبيت النتروجين الجوي بواسطة الرايزوبيا [12] وقد حصل الاخير على نتائج معنوية
 في اعداد العقد الجذرية لنبات الباقلاء (Faba bean) (Yellow lupin) نتيجة تطبيق
 النحاس الى التربة وعل ذلك بالمشاركة المباشرة الفعالة للنحاس في التفاعلات المؤكسدة لمركبات العقد الجذرية
 الفينولية حيث ان المركبات الفينولية تتأكسد الى كوينونات (Quinones) بواسطة انزيم النحاس (Polyphenol
 oxidase) حيث تتبلر هذه الكوينونات الى مركبات الميلانين ولكن وعلى ما يبدو ليس هناك تأثير واضح على
 (Soybean) ولربما بسبب متطلبات فسق الحقل العالية للحديد . واذف الى ان هناك
 علاقة واضحة بين نقص النحاس وكل من الاوكسجين في العقد والاكسدة الفوقية للشحوم (lipid
 peroxidation) مزيد من الدراسة .

ومن المعروف ان رش الاوراق بالعناصر الغذائية بسبب ارتفاع تركيزه في النبات حيث اشار [13]
 العناصر الغذائية تمتص عن طريق الاوراق بطريقتين اولها طريقة الـ Symplasm
 سايتوبلازمية (Ectodesmata) موجودة تحت طبقة كيوكل خلايا بشرة الاوراق ومن ثم عن طريق
 السايتوبلازم الى اجزاء النباتات الأخرى ومنها الجذور. والثانية عن طريق الـ (Apo-plasm) أي عن طريق
 الثغور أو المسافات البينية بين خلايا الورقة حتى وصول الأوعية الناقلة ثم إلى أجزاء النبات المختلفة. وبهذه
 الاليات يمكن التخلص من التضاد الحاصل بين العناصر الغذائية المهمة في التربة .

12 إنزيمات ، والتي هي من نوع انزيمات الأكسدة
 (Oxidase) في كل من النبات والحيوان [5] . الا ان الاهمية المباشرة للنحاس في نمو النبات وتكوين العقد
 الجذرية هو دوره في عملية التركيب الضوئي لقيامه بنقل الالكترونات عند تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة
 كيميائية (كاربونية) [6] . والتي هي اساس علاقة التعايش بين الرايزوبيا والبقول والتي تستعمل لتنشيط الكثير
 من الفعاليات الحيوية كنمو المجموع الخضري والجذري وبالتالي تزداد ا
 يشجع العلاقة التعايشية مع بكتريا الرايزوبيا الحرة المعيشة في التربة [14] . ومن ناحية اخرى فان اشترك
 النحاس في تركيب انزيمات الاكسدة والاختزال التي تساهم في عمليات الاكسدة والاختزال في خلايا انسجة
 النبات والتي تؤدي عمليات حيوية مثل التنفس وتكوين الكلوروبلاست والبروتين واختزال النترات في اثناء تثبيت
 النتروجين الجوي في البقوليات وتكوين فيتامين C بالاضافة الى زيادة قابلية النبات على تكوين الاحماض النووية
 DNA RNA وبالتالي زيادة الانقسام الخلوي وتحسين نمو النبات [6] مما يزيد الطلب على النتروجين
 المثبت تعايشياً بواسطة الرايزوبوبيوم وان هذا الطلب المتزايد يعتبر من اهم العوامل المشجعة على تنشيط
 وتفعيل عمل العقد الجذرية (الباكترويدات) في تثبيت النتروجين الجوي [14] .
 K
 Mn Cu Zn يعمل على زيادة مقاومة النبات للاصابة بالامراض والحشرات [15] .

2 تأثير رش الحديد في اعداد العقد الجذرية:

يظهر جدول (2) نتائج التحليل الاحصائي التي ابرزت تفوق جميع معاملات الرش بالحديد Fe1 Fe2 معنويا (Fe0) / 3.25 بينما سجلت معاملات الرش بالحديد Fe1 / 5.08 7.25 Fe2 . ان الابعاث المنجزة في تأثير الرش بالحديد في اعداد العقد الجذرية للنباتات البقولية نادرة جداً رغم توفر العديد من الدراسات حول تأثير اضافة الحديد للتربة في كل من البقوليات والرايزوبيا [16] . سجل احد الباحثين [17] في تجربة بيت زجاجي مع التربة الكلسية وفتق الحقل زيادة بارزة في اعداد واوزان العقد الجذرية لنباتات فتق الحقل المرشوشة بالحديد مقارنة بالنباتات الغير مرشوشة بالحديد فيعد خمسة ايام على رش الحديد اظهرت عقد النباتات المرشوشة تضاعف عدد الباكترويدات (Bacteroids) 200 14 تضاعف اكثر في تركيز الهيموكلوبين في العقد الجذرية وانتهت اعراض نقص الحديد وتفعيل عمل انزيم النتروجينيز . وعلى ما يبدو ان الرش بالحديد احد الاساليب المهمة ذات التأثير المباشر في زيادة قابلية النباتات البقولية الحاوية على العقد الجذرية البكتيرية والمزروعة في تربة تعاني من نقص محتواها من الحديد الجاهز وكما هي الحالة في التربة العراقية ، على تحسين كفاءة عملية تثبيت النتروجين الجوي .

(2): تأثير زمن الرش بالحديد والحديد في اعداد العقد الجذرية (عقدة / نبات) لنوعين من الفاصولياء

Cu		Fe		Cu×S		Fe×Cu		Bean Types		Cu		Fe	
Means	Means	Means	Means	Means	Means	Means	Means	S2	S1	Cu 0	Fe 0	Cu 1	Fe 1
Cu0	3.25	4.11	2.83	3.33	2.33	Cu 0	Fe 0						
4.50 b	c	S1×Cu0	3.67	4.00	3.33	Cu 1	Fe 0						
		5.44	6.33	3.67	2.83	Fe0 Means×S							
Cu1	7.25	S1×Cu1	6.33	6.67	6.00	Cu 0	Fe 1						
5.89 a	a	4.89	8.17	9.00	7.33	Cu 1	Fe 1						
		S2×Cu0	7.83	6.67	6.67	Fe1 Means×S							
	5.08	6.33	4.33	4.67	4.00	Cu 0	Fe 2						
	b	S2×Cu1	5.83	6.00	5.67	Cu 1	Fe 2						
				5.33	4.83	Fe2 Means×S							
				5.61 A	4.78 B	S Means							

LSD 0.05, S=0.5569, Fe=0.6821, Cu=0.5569, S×Fe=1.3053, S×Cu=1.873, Fe×Cu=1.0509, S×Fe×Cu=1.3641

S = الحديد = Cu = Fe

يعد الحديد ذو أهمية كبيرة لعملية تثبيت النتروجين الجوي وخاصة تعايشاً في النباتات البقولية وذلك العملية ، البكتريا العقدية والنبات البقولي العائل له ، فبالنسبة للبكتريا يدخل الحديد في تركيب نوعين من البروتين (Fe Protien, Mo Fe-protein) المكونة لا نزييم النتروجينيز وفي تكوين مادة الكهيموكلوبين الموجودة داخل العقد الجذرية وفي نمو هذه العقد وفعاليتها وكذلك يؤثر على تواجد البكتريا العقدية في التربة قبل اقامتها للعلاقة التعايشية مع النبات العائل كما ان له اهميته مباشرة في تكوين وبناء الكلوروفيل وفي نشاط العديد من الانزيمات (key enzymes) [18] . وبالاخص انزيمات نقل الالكترونات electron carrier ferredoxin [16] لقدرة الحديد على اكتساب وفقد الالكترونات ضمن عمليات الاكسدة والاختزال داخل النسيج النباتي اذ ان الحديد يشترك في تركيب العديد من الانزيمات التنفسية الموجودة في النبات مثل Peroxidase , Cytochromr Oxidase Catalase ويدخل الحديد مكوناً أساسياً في تركيب الساييتوكرومات وهي بروتينات هيمية تقوم بدور حوامل وسطية للالكترونات في السلسلة التنفسية ولذلك تكون مهمة في التفاعلات التنفسية للنباتات بما يشبه النظام التنفسي للحيوان وتحتوي البلاستيدات الخضراء على بروتينات غير هيمية هي لفيردوكسينات والتي تحوي على المجموعة الفعالة Fe₂S₂ والتي يتم فيها نقل الالكترونات بواسطة الحديد وله أثر هام في بناء الخلية النباتية كما ان وظيفة الحامض النووي RNA للخلية تتأثر بفعل نقص الحديد . امتصاص الحديد يعتمد على مقدرة الجذور على اختزال الحديد الى حديدوز .

الحديد في Fe³⁺ في القسم الخارجي من البلازما يحفز بواسطة مصدر الالكترونات داخل الخلية النباتية . حركة الحديد المخلي داخل النبات اسرع 2-3 مرات من حركته بصورته الايونية وان صور الحديد المتحركة داخل النبات هي على الاغلب بشكل سترات الحديد ، وان نقص الحديد يؤدي الى حدوث خلل في جميع اجهزة التركيب الضوئي وذلك لان الحديد يرتبط بالاحماض الأمينية وغيرها من البوليميرات الحيوية فضلاً عن اشتراك اشر وفعال في تفاعلات الاكسدة و الاختزال لعملية التركيب الضوئي [16, 18] .

ان رش الاوراق بالعناصر الغذائية يسبب ارتفاع تركيزه في النبات . مما يسبب تلبية الحاجة المباشرة لعنصر الحديد لكل من العائل البقولي والبكتريا ولعملية بناء الكلوروفيل حيث يعتبر الاخير الوحدة الاساسية لعملية البناء الضوئي والتي تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية (كاربونية) . والتي هي اساس علاقة التعايش بين الرايزوبيا والبقول والتي تستعمل لتنشيط الكثير من الفعاليات الحيوية كنمو المجموع مما يشجع العلاقة التعايشية مع بكتريا

الرايزوبيا الحرة المعيشة في التربة [14] .

أن النباتات البقولية المتكافلة مع بكتريا الرايزوبيا تحتاج فيها عملية تكوين العقد الجذرية وتثبيت النتروجين كميات من الحديد أعلى من حاجة كل من النبات نفسه والبكتريا على حدٍ للحديد فأن نمو هذه النباتات سيتأثر بشكل حاد عند نقص الحديد اذا ما قورنت بالنباتات المجهزة بمصدر نتروجيني معدني بسبب التأثير الواضح للحديد في عملية تثبيت النتروجين حيث ان نقص الحديد يسبب الانخفاض الشديد في كل من اعداد واوزان الجذرية ومحتوى خضاب العقد (Leghemoglobin) واعداد الباكترويدات في العقد وفعالية انزيم النتروجينيز [18, 16] .

3 تأثير زمن الرش في اعداد العقد الجذرية:

يعد الزمن من العوامل المهمة جداً رغم ان الدراسات التي اجريت حوله تكاد تكون معدومة حيث ان [19] من الدراسات القليلة في هذا المجال . ويمكن تعريف عامل الزمن الحقيقي (RTF) هو مقياس شائع لقياس سرعة اجراء عملية (Process) ما او المدة المطلوبة لاجراء عملية ما [21,20] ووحدها من اجزاء الثانية الى

اظهرت نتائج التحليل الاحصائي تفوق مدة الرش بالحديد بعد 20 يوم من البذار Fe1 معنوياً على مدة الرش بعد 30 يوم من البذار Fe2 يلها (7.25 5.08) / . وعلى ما يبدو ان التجهيز المبكر للحديد لسد حاجة عملية تكوين العقد الجذرية انعكس ايجابيا على اعداد العقد الجذرية وفعاليتها في تثبيت النتروجين الجوي مما حفز تجهيز النبات بالنتروجين بصورة ابرك داعماً نمو المجموع الجذري والخضري ازدياد المساحة الفعالة للجذور والاوراق وازدياد كثافة انتشار مواقع الإصابة على الجذور وشجع تطور الإصابة الاولى في الجذور بواسطة بكتريا اللقاح

()

عامة يحسن انتاج وتجهيز الطاقة (الكاربون) لوحدات تثبيت النتروجين البكتيرية (Bacteroids) الجذرية والذي يعد من اهم عوامل تطور الإصابة الاولى في نسيج لحاء الشعيرات الجذرية . ومن ناحية اخرى فان زيادة الطلب على النتروجين المثبت من قبل النبات يعد من العوامل ذات التأثير المباشر في تشجيع تطور وتكوين وعمل العقد الجذرية وان دور النحاس في الانزيمات واختزال النترات وتكوين الكلوروبلاست والبروتين وتكوين الاحماض النووية DNA RNA وموعد اضافة (خمسة ايام بعد رش الحديد) الاستهلاك والطلب على النتروجين المثبت حيويًا لاجل استعماله في الايض والبناء الخلوي وبالتالي زيادة الانقسام الخلوي وتحسين نمو المجموع الخضري (الاوراق) والجذري . دعم بصورة مباشرة امتصاص العناصر الغذائية المهمة الاخرى .

من اسباب تفوق مدة الرش بالحديد بعد 20 يوم من البذار Fe1 30 يوم من البذار Fe2 رغم انهما بنفس الجرعة هو ان نشاط بكتريا الرايزوبيا في التربة (اللقاح البكتيري) تبدأ بالانخفاض بعد مرور 21 يوم من بدء نشر اللقاح في التربة [19] الى أن اعداد الخلايا الحية قد ازدادت خلال مدد التحضين (3, 9, 15, 21) يوم مقارنة بالأعداد التي سجلت في بداية التجربة عند الزمن صفر وبدأت بالانخفاض قليلاً في المدة الأخيرة 21 يوم وقد يعود إلى موت بعض الخلايا لتناقص العناصر الغذائية في التربة

إلى انه بعد مرور 21 يوماً من التحضين ربما حصلت تغيرات غير ملائمة في بيئة نمو البكتريا مما ظهر في خفض أعداد البكتريا خلال مدة التحضين الأخيرة . وبناءً على ذلك فلا بد من دعم البكتريا المتكافلة مع العائل 21 يوماً من بدء عملية التلقيح والبذار حيث تعتبر هذه المدة مناسبة لتوفر مجموع

خضري مناسب لعملية الاخصاب الورقي () .

4 تأثير نوع البذور (العامل الوراثي البيئي) في اعداد العقد الجذرية

يتضح من جدول (2) S2 معنوياً على النباتات الناتجة عن البذور

صنف برازيلي S1 في اعداد العقد الجذرية حيث سجل الاول 5.61 عقدة / نبات والاخير 4.78 /

رغم انهما يعودان الى نفس النوع النباتي . وعلى ما يبدو ان توافق اللقاح البكتيري مع النوع الاول S2 من الاخير S1 ذلك ان التعايش هي وظيفة مستجيبة بصورة فعلية لحوافر وراثية وبيئية

عديدة [22] . [23] اختلافاً وراثياً بين أصناف الفاصولياء الكفوءة وغير الكفوءة في مدى الانتفاع من التلقيح والمغذيات المتوافرة والمرتبطة مع البنية الوراثية للعائل النباتي . لشيء نفسه بالنسبة للبكتريا العقدية إذ إن شركاءها البكتيريين التعايشيين متنوعون إلا أنهم يشتركون في امتلاكهم مورث وعامل تكوين العقد [4] . ان تأثير العامل الوراثي النباتي يختلف ضمن الصنف الواحد من النبات في نوع افرازات الجذور وكثافة انتشار المساحة السطحية الفعالة للجذور والتي تعد من اهم العوامل التي تؤثر في عملية تكوين العقد بعد تثبيت عامل القاح على كلا اصناف البذور في التجربة . ومن ناحية اخرى فان تأثير العامل البيئي لمنشأ البذور له تأثير مهم حيث ان بيئة البرازيل استوائية او شبه استوائية بينما البيئة الاسبانية تقع ضمن مناخ البحر الابيض المتوسط الذي يقع العراق ضمن مناخه وعلى ما يبدو ان الصنف الاسباني كان اكثر ملائمة للبيئة العراقية من الصنف البرازيلي .

5 تأثير التداخل بين النحاس والحديد في اعداد العقد الجذرية Fe×Cu:

اظهر جدول (2) تحليل الاحصائي التي افرزت تفوق معاملة تداخل النحاس والحديد Fe1×Cu1 معنويا على باقي معاملات تداخل الحديد والنحاس عند تسجيلها 8.17 عقدة / نبات تلتها وبفارق معنوي معاملة التداخل Fe1×Cu0 6.33 عقدة / نبات والتي لم تسجل فروق معنوية مع معاملة التداخل Fe2×Cu1 بلوغها 5.83 عقدة / نبات حيث تفوقت هذه المعاملات معنويا على معاملة المقارنة التي سجلت 2.83 / . أن أسباب زيادة أعداد العقد الجذرية عند التداخل بين النحاس والحديد يعود إلى تأثير هذين العنصرين المهمين في الكثير من الفعاليات الحيوية لكل من بكتريا الرايزوبيا والعائل النباتي والعلاقة التعايشية بحد ذاتها إذ أن تأثير الرش المتتابع بهما زمنياً قد زاد على ما يبدو هذا التأثير وبالتالي اثر إيجاباً في اعداد العقد الجذرية.

6 تأثير التداخل بين صنف البذور والنحاس في اعداد العقد الجذرية Cu×S:

يتضح من جـ (2) ونتائج التحليل الإحصائي Cu1×S2 معنويا على معاملة المقارنة وعدم وجود فروق معنوية بين باقي معاملات التداخل . حيث سجلا 6.33 4.11 /

7 تأثير التداخل بين صنف البذور والحديد في اعداد العقد الجذرية Fe×S:

يظهر جدول (2) تأثير التداخل بين صنف البذور والحديد إذ وصلت أعداد العقد البكتيرية الجذرية إلى ذروتها S2×Fe1 7.83 عقدة / نبات وبفارق معنوي عن جميع معاملات تداخل صنف البذور والحديد عدا معاملة التداخل S1×Fe1 6.67 / نبات حيث لا توجد فروق معنوية فيما بينها ولكنهما تفوقتا معنويا على باقي معاملات تداخل صنف البذور والحديد وعلى معاملة المقارنة التي سجلت 2.83 / .

8 تأثير التداخل بين صنف البذور والنحاس والحديد في اعداد العقد الجذرية:

بينت النتائج في جدول (2) والتحليل الإحصائي تفوق معاملة تداخل صنف البذور والنحاس والحديد Fe1×Cu1×S2 معنويا على جميع معاملات تداخل صنف البذور والنحاس والحديد عند تسجيلها 9.00 / تلتها وبفارق معنوي معاملة التداخل Fe1×Cu1×S1 7.33 / وكما ذكرنا سابقاً فإن التأثير المتداخل لكل من النحاس والحديد بهما زمنياً قد زاد على ما يبدو هذا التأثير وبالتالي اثر معنويا في اعداد العقد الجذرية .

(ورقة / نبات) لنوعين من الفاصولياء				(3): تأثير زمن الرش بالنحاس والحديد في			
Cu	Fe	Cu×S	Fe×Cu	Bean Types		Cu	Fe
Means	Means	Means	Means	S2	S1		
Cu0	40.75	44.00	39.00	40.00	38.00	Cu 0	Fe
45.39b	c	S1×Cu0	42.50	43.33	41.67	Cu 1	0
		47.00		41.67	39.83	Fe0 Means×S	
Cu1	53.50	S1×Cu1	51.00	52.67	49.33	Cu 0	Fe
49.06a	a	46.78	56.00	59.33	52.67	Cu 1	1
		S2×Cu0		56.00	51.00	Fe1 Means×S	
	47.42	51.11	46.17	47.67	44.67	Cu 0	Fe
	b	S2×Cu1	48.67	50.67	46.67	Cu 1	2
				49.17	45.67	Fe2 Means×S	
				48.94 A	45.50 B	S Means	

LSD 0.05, S=0.9807, Fe=1.2011, Cu=0.9807, S×Fe=3.0312, S×Cu=5.6958, Fe×Cu=2.959, S×Fe×Cu=2.4022

9 تأثير النحاس في اعداد :

يرز جدو (3) نتائج التحليل الاحصائي وتفوق معاملة النحاس Cu1 معنوياً مقارنة بباقي معاملات النحاس باحرازها اعلى متوسط اعداد اوراق نباتية بلغ 49.06 /

45.39 / . وعلى ما يبدو لم نجد دراسات مماثلة حول تأثير الرش بالنحاس على اعداد اوراق نباتات الفاصولياء الا ان احد الباحثين [12] حصل على نتائج معنوية نتيجة اضافة النحاس الى التربة (Faba bean)

(Yellow lupin) . كما اظهرت عدد من الدراسات ان نقص النحاس المبكر في التربة يتعارض مع عملية تثبيت النتروجين الجوي تعايشياً والذي يعتبر من اهم عوامل النمو الخضري للعائل البقولي . كما في نباتات الجب الابيض والجب تحت الارضي (Subterranean Clover) [5, 12] حيث ان التغذية الارضية بالنحاس لنباتات الترمس *Lupinus luteus* L له تأثير ايجابي على عملية تثبيت النتروجين الجوي تكافلياً بواسطة بكتريا الرايزوبيا [12] .

وكما تم الاشارة اليه سابقاً ان رش الاوراق بالعناصر الغذائية يسبب ارتفاع تركيزه في النبات ع [13] وان النحاس مشترك على الأقل في دزينة إنزيمات ، والتي هي من نوع انزيمات الأكسدة في كل من النبات والحيوان [5]. الا ان الاهمية المباشرة للنحاس في نمو النبات وتكوين اوراق النبات هو دوره في عملية التركيب الضوئي لقيامه بنقل الالكترونات عند تحويل الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية (كاربونية) [6] . والتي هي اساس علاقة التعايش بين الرايزوبيا والبقول والتي تستعمل لتنشيط الكثير من الفعاليات الحيوية كنمو المجموع [14] . ومن ناحية اخرى فان اشتراك

النحاس في تركيب انزيمات الاكسدة والاختزال التي تساهم في عمليات الاكسدة والاختزال في خلايا انسجة النبات والتي تؤدي عمليات حيوية مثل التنفس وتكوين الكلوروبلاست والبروتين واختزال النترات في اثناء تثبيت النتروجين الجوي في البقوليات بالاضافة الى زيادة قابلية النبات على تكوين الاحماض النووية DNA RNA وبالتالي زيادة الانقسام الخلوي وتحسين نمو النبات عامة والمجموع الخضري خاصة [6] .

10 تأثير رش الحديد في اعداد اوراق النبات:

يلخص جدول (3) نتائج التحليل الاحصائي التي اظهرت تفوق جميع معاملات الرش بالحديد Fe1 Fe2 معنوياً (Fe0) 40.75 / بينما سجلت معاملات الرش بالحديد

Fe2 Fe1 (47.42 53.50) / . الابحاث المنجزة في تأثير الرش بالحديد في اعداد لنباتات البقولية نادرة جداً رغم توفر العديد من الدراسات حول تأثير اضافة الحديد للتربة في كل من البقوليات والرايزوبيا [16] [18] .

الباحثين [24, 25] توصلوا الى أن الرش بالمحلول المغذي (النهرين) الحاوي على الحديد أدى إلى زيادة معنوية (*Allium sativum* L) (*Lycopersicon esculentum*)

يعد الحديد ذو أهمية كبيرة مباشرة في تكوين وبناء الكلوروفيل وفي نشاط العديد من الانزيمات (key electron carrier ferredoxin) [16] .

ان رش الاوراق بالعناصر الغذائية يسبب ارتفاع تركيزه في النبات . مما يسبب تلبية الحاجة المباشرة لعنصر الحديد للعائل البقولي ولعملية بناء الكلوروفيل حيث يعتبر الاخير الوحدة الاساسية لعملية التركيب الضوئي الجارية في الاوراق والتي تحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية (كاربونية) . والتي هي اساس علاقة التعايش بين الرايزوبيا والبقول والتي تستعمل لتنشيط الكثير من الفعاليات الحيوية كنمو المجموع [14] . مما يشجع النمو الخضري وازدياد

. كما ان توفر النتروجين المثبت حيويًا في العقد الجذرية المستفيدة من تـ

الكيميائية يدعم بصورة مباشرة النمو الخضري عامة واعداد الاوراق خاصة .

11 تأثير زمن الرش في اعداد اوراق النبات:

اظهرت نتائج التحليل الاحصائي تفوق مدة الرش بالحديد بعد 20 يوم من البذار Fe1 معنوياً على مدة الرش بعد 30 يوم من البذار Fe2 عند تسجيلهما (53.50, 47.42) / . وللأسف ايضا وعلى ما يبدو

لا توجد دراسات حول تأثير زمن الرش بكل من النحاس والحديد في اعداد اوراق النباتات البقولية التجهيز المبكر للحديد لسد حاجة عملية تكوين العقد الجذرية انعكس ايجابيا على اعداد العقد الجذرية وفعاليتها في تثبيت النتروجين الجوي مما حفز تجهيز النبات بالنتروجين بصورة ابكر داعمًا نمو المجموع الجذري والخضري ازدياد المساحة الفعالة للجذور والاوراق وازدياد كثافة انتشار مواقع الاصابة على الجذور وشجع تطور الاصابة الاولى في الجذور بواسطة بكتريا اللقاح

()

عامة يحسن انتاج وتجهيز الطاقة (الكاربون) لوحدة تثبيت النتروجين البكتيرية (Bacteroids) النبات والذي يعد من اهم عوامل تطور الاصابة الاولى في نسيج لحاء الشعيرات الجذرية .

الانزيمات واختزال النترات وتكوين الكلوروبلاست والبروتين وتكوين الاحماض النووية DNA RNA وموعداضافة (خمسة ايام بعد رش الحديد) شجع الاستهلاك والطلب على النتروجين المثبت حيويًا لاجل استعماله في الايض والبناء الخلوي وبالتالي زيادة الانقسام الخلوي وتحسين نمو المجموع الخضري (الاوراق) . كما ان تحسن نمو المجموع الجذري دعم بصورة مباشرة امتصاص العناصر الغذائية المهمة الاخرى

وكما نوهنا سابقا في اسباب تفوق مدة الرش بالحديد بعد 20 يوم من البذار Fe1 30 يوم من Fe2 رغم انهما بنفس الجرعة , كان بسبب ان نشاط بكتريا الرايزوبيا في التربة (اللحاق البكتيري) تبدا 21 يوم من بدء نشر اللقاح في التربة [19] الى ان اعداد الخلايا الحية قد

ازدادت خلال مدد التحضين الأربع المذكورة سابقا الا انها بدأت بالانخفاض قليلاً في المدة الأخيرة 21 يوم بسبب موت الخلايا البكتيرية لانخفاض مستويات العناصر الغذائية في التربة وحصول تغيرات غير ملائمة في بيئة نمو البكتريا مما انعكس سلبا في اعداد البكتريا خلال مدة التحضين الأخيرة .

12 تأثير نوع (- البيئي) في اعداد اوراق النبات:

يمكن الاستنتاج من جدول (3) S2 معنوياً على النباتات الناتجة عن البذور صنف برازيلي S1 حيث سجل الاول 48.94 / بات والاخير 45.50

/ نبات رغم انهما يعودان الى نفس النوع النباتي . وعلى ما يبدو لا توجد دراسات حول تأثير نوع بذور الفاصولياء في اعداد اوراق الفاصولياء الا انه وكما ذكرنا سابقا ان توافق اللقاح البكتيري مع النوع الاول S2 كان بدرجة معنوية اكبر من الاخير S1 ذلك ان التعايش هي وظيفة مستجيبة بصورة فعلية لحوافز وراثية وبيئية عديدة [22] . [23] اختلافاً وراثياً بين اصناف الفاصولياء الكفوءة وغير الكفوءة في مدى الانتفاع من التلقيح والمغذيات المتوفرة والمرتبطة مع البنية الوراثية للعائل النباتي .

13 تأثير التداخل بين النحاس والحديد في اعداد اوراق النبات Fe×Cu:

اظهر جدول (3) نتائج التحليل الاحصائي التي افرزت تفوق معاملة تداخل الحديد والحديد Fe1×Cu1 معنوياً على باقي معاملات تداخل الحديد والنحاس عند تسجيلها 56.00 ورقة / نبات تلتها وبفارق معنوي معاملة التداخل Fe1×Cu0 51.00 ورقة / نبات والتي لم تسجل فروق معنوية مع معاملة التداخل Fe2×Cu1 بلوغها 48.67 ورقة / نبات حيث تفوقت هذه المعاملات معنوياً على معاملة المقارنة التي سجلت 39.00 / . أن أسباب زيادة اعداد اوراق النبات عند التداخل بين النحاس والحديد يعود إلى تأثير هذين العنصرين المهمين في الكثير من الفعاليات الحيوية للعائل النباتي والعلاقة التعايشية بحد ذاتها إذ أن تأثير الرش المتتابع بهما زمناً قد زاد على ما يبدو هذا التأثير وبالتالي اثر ايجاباً في اعداد اوراق النبات .

:Cu×S

عن صنف البذور والنحاس

يتضح من جدول (3) ونتائج التحليل الإحصائي $Cu1 \times S2$ معنوية
عدم وجود فروق معنوية فيما بين معاملات التداخل الأخرى . حيث سجلا (51.11)
(44.00) /

15 تأثير التداخل بين صنف البذور والحديد في اعداد اوراق النبات $Fe \times S$:

(3) يظهر تأثير التداخل بين صنف البذور والحديد إذ وصلت أعداد الاوراق النباتية إلى ذروتها عند
 $S2 \times Fe1$ 56.00 ورقة / نبات ويفارق معنوي عن جميع معاملات تداخل صنف
البذور والحديد تلتها ويفارق معنوي معاملة التداخل $S1 \times Fe1$ 51.00 ورقة / نبات ليتبعها معاملة
 $S2 \times Fe2$ وبدون فارق معنوي عند بلوغها 49.17 ورقة / نبات لكنهما تفوقتا معنويًا على باقي
معاملات تداخل صنف البذور والحديد وعلى معاملة المقارنة التي سجلت 39.833 / . ان هذه النتائج
تظهر اختلاف استجابة اصناف الفاصولياء للاخصاب الورقي بالحديد ومدى الانتفاع من عملية الرش .

16 تأثير التداخل بين صنف البذور والنحاس والحديد في اعداد اوراق النبات:

بينت النتائج في جدول (3) والتحليل الإحصائي تفوق معاملة تداخل صنف البذور والنحاس والحديد
 $Fe1 \times Cu1 \times S2$ معنويًا على جميع معاملات تداخل صنف البذور والنحاس والحديد عند تسجيلها 59.33 /
تلتها ويفارق معنوي م $Fe1 \times Cu1 \times S1$ 52.67 / تلتها وبدون فارق
 $Fe2 \times Cu1 \times S2$ 50.67 ورقة / نبات الا انهما

38.00 / . وكما ذكرنا سابقا فإن التأثير المتداخل لكل من النحاس والحديد اضافة الى
صنف البذور المناسب والرش المتتابع بهما زمنيا قد زاد على ما يبدو هذا التأثير وبالتالي اثر معنويًا في اعداد

17 العلاقة بين اعداد العقد البكتيرية الجذرية واوراق نباتات الفاصولياء:

اظهرت النتائج في الجدولين (2, 3) ارتباط اي (r) فيما بين اعداد كل من العقد الجذرية واعداد
اوراق نباتات الفاصولياء بلغ 0.899 حيث ان العقد الجذرية الفعالة هي مصدر مهم بيئيا واقتصاديا للنتروجين
المثبت حيويًا للنباتات البقولية والمهم جدا في نمو النبات بصفة عامة والمجموع الخضري خاصة (الاوراق
) وان اداء وحدة تثبيت النتروجين التعايشية (البكترويد) في العقد الجذرية وكميات النتروجين المثبت
تتأثر بصورة مباشرة بتجهيز مركبات الطاقة الكيميائية (الكاربون) والتي تعتبر المصدر الرئيسي للكاربون المهم
جدا لنمو وتكاثر وايض البكترويد والتي يتم انتاجها في الاوراق النباتية وان اي عامل يسهم بصورة مباشرة
او غير مباشرة في زيادة انتاج كل من النتروجين المثبت حيويًا ومركبات الطاقة الكيميائية النباتية سيدعم بصورة
وان هذا بدوره سيزيد المساحة الفعالة لكل من ()

المجموع الخضري والجذري ليضاف عاملا اضافيا يزيد تكوين ونمو العقد الجذرية وزيادة امتصاص العناصر
الغذائية المهمة عامة وتثبيت النتروجين تكافليا وعملية انتاج الطاقة الكيميائية والكاربون مما يسبب ازدياد
همة في دوران عجلة النمو الخضري (الاوراق والساق) والجذري (الشعيرات الجذرية والعقد
الجذرية) وبالتالي ينعكس ايجابيا على الحاصل والبيئة . ومن ناحية اخرى فان عملية الرش بحد ذاتها ولو بالماء
سيعمل على تنظيف سطح الاوراق ومسماستها من الغبار والملوثات البيئية الاخر
يزيد كفاءة عمل الاوراق في عملية التركيب الضوئي والمسماستها في عملية التنفس والتبادل الغازي مما سينعكس
اجابًا على انتاج الطاقة الكيميائية المهمة في كثير من الفعاليات الحيوية لكل من العائل البقولي والعقد البكتيرية
حد ذاتها. فتزداد كفاءة النبات على تبادل الغازات من البيئة المحيطة فيتوفر للبلاستيدات
الخضراء الماء وثاني اوكسيد الكربون والطاقة ومن ثم يتمكن النبات من انتاج الاوكسجين والطاقة اللازمة
لامتصاص المغذيات وكفاءة اعلى من الجذور .

1. Havlin, J. L.; J. D. Beaton; S. L. Tisdale and W. L. Nelson. 1999. Soil Fertility and Fertilizers (sixth edition). An Introduction to Nutrient Management.
2. Franco, A. A. 1998. Importance of Biological N_2 Fixation in Sustainable Agriculture. EMBRADA-Agrobiologia, Km 47, Seropcdica Rj, 23851-970 Brazil.
3. Demerchi, Salh Mahmood, 1985. The First Council in the Biological Nitrogen Fixation. Biology Research Center, Department of Microbiology, Baghdad, Iraq.

4. Elmerich, C.; A. Kondorosi and W. E. Newton. 1998. Biological Nitrogen Fixation for the 21st Century. Kluwer Academic Publishers. Paris.
5. O'Hara, G. W. 2001. Nutritional Constraints on Root Nodule Bacteria Affecting Symbiotic Nitrogen fixation: a Review. Centre for *Rhizobium* Studies, School of Biological Sciences and Biotechnology, Murdoch University, Murdoch, Australia. Aust. J. of Exp. Agri., 41, 417-433.
6. Amadi, Tarq Hassan, 1991. Micronutrient in Agriculture. Soil & Water Science, College of Agriculture, University of Baghdad, IRAQ.
7. Al-Taher, faysal mahbas madlol, 2005. Effect of Different Foliar Nutrition of Iron, Zinc and Potassium on the Growth and Yield of Wheat. M.Sc. thesis, College of Agriculture - University of Baghdad. Iraq.
8. Hussein, M.M., Abd El-Kader, A.A. and Mona A. M., 2009. Mineral Status of Plant Shoots and Grains of Barley under Foliar Fertilization and Water Stress. Research J. of Agri. and Bio. Sci., 5(2): 108-115.
9. Nasef, M.A.; Nadia, M. B. and Amal, F. A., 2006. Response of Peanut to Foliar Spray with Boron And / or *Rhizobium* inoculation. J. of Appl. Sci. Res., 2(12): 1330-1337.
10. Kassab, O.M., 2005. Soil Moisture Stress and Micronutrients Foliar Application Effects on the Growth and Yield of Mungbean Plants. J. Agric. Sci., Mansoura University, 30: 247-256.
11. Beck, D.P; L. A. Materon and F.A. Fadi., 1993. Practical *Rhizobium* Legume Technology Manual. Technical No: 19. ICARDA, Syria.
12. Seliga, Henryka. 1997. Physiological Aspects of Nitrogen Fixation Response to Copper Nutrition in Several Grain Legume Species. In: Plant Nutrition for Sustainable Food Production and Environment. Ando et al (Eds.), 1997. p. 699-702.
13. Al-Sahaf, Fadhel Husain Redha, 1989. Practical Plant Nutrition. University of Baghdad, Ministry of Higher Education, Iraq.
14. Al-Sadi A. S., 2007. Effect of Potassium and Cobalt on *Rhizobium* Efficiency and on Growth and Yield of *Phaseolus vulgaris* L., M.Sc. thesis, College of Agriculture - University of Baghdad. Iraq.
15. Ahmed, Firas Wa'dallah, 2006. Effect of Fertilizers Addition of K and Mg in Soil and Foliar Application on Tomato Growth and Yield Under Plastic House Conditions. M.Sc. Thesis, College of Agriculture - University of Baghdad. Iraq.
16. Osotsapar Y., 2005. Micronutrients in Crop Production in Thailand. Department of Soils, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Kamphaeng Sean, Nakorn Pathom 73140, Thailand.
17. Parkpian, P, and N .Boonkerd .1989. Involvement of Iron in Nodulation and Symbiotic Nitrogen Fixation in Groundnut. In :The Proceedings of National Groundnut Conference. Roi et., Thailand.
18. Alkrtani, R. 2005. Effect of Iron and Phosphorus on *Rhizobium* Efficiency and on Growth and Yield of cowpea. M.Sc. Thesis, College of Agriculture - University of Baghdad. Iraq.
19. Abdulameer, Ali Sabeeh. 2010. Effect of Time Factor, Molybdenum and Potassium on *Rhizobium* Growth in the Al-jaderya Sterilized Soil. Baghdad Science Journal. Vol. 7, No. 3.

20. Wikipedia, 2010. The Free Encyclopedia. USA.
21. Baalbaki, Ramzi Munir, 2009. Al-Mawrid Al-Hadeeth. Dar El-Ilm Limalayin Publisher, Lebanon. P: 1230.
22. Vance, C. P. 2001. Agronomy and Ecology of Nitrogen Fixation. United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, Plant Science Research Unit, Department of Agronomy and Plant Genetics, University of Minnesota, St. Paul, MN, 55108, USA.
23. Shea, P. F., G. C. Gerloff and W. ZH. Gabelman.1968. Differing Efficiencies of Potassium Utilization in Strains of Snap beans. Departments of Horticulture and Botany, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin. Plant and Soil, XXVIII, no.2.
24. Al-Mohamdawi, Saad Khalaf Menshed, 2004. Effect of Foam Sulfur Addition and Spray Nutrition of Al-Nahrain Solution on the Growth and yield of Garlic (*Allium sativum* L). M.Sc. thesis, College of Agriculture - University of Baghdad. Iraq.
25. Al-Recabi, Fakher Hamed Ibraheem and Muntser Mansour, 2001. Response of Tomato Plants (*Lycopersicon esculentum*) to Cycosel Spraying and Foliar Nutrition to Improve Some of Effective Characteristics on the Production. Iraqi Agricultural Science Journal, Vol: 32, No: 1.